

PRESCAINA 0,2% ○

COLIRIO

COMPOSICIÓN

Oxibuprocaina clorhidrato 2 mg; excipiente, que contiene: timerosal, edetato disódico, ácido bórico, cloruro sódico, agua purificada c.s.p. 1 ml.

INDICACIONES

Anestesia local.

POSOLOGÍA

Vía oftálmica.

Dadas las características farmacológicas, es un producto para uso bajo supervisión médica y su dosis varía de 1 a 3 gotas, según la finalidad perseguida.

CONTRAINDICACIONES

Pacientes hipersensibles al producto.

ADVERTENCIA SOBRE EXCIPIENTES

Este medicamento, por contener ácido bórico como excipiente, está contraindicado en niños menores de 3 años.

Este medicamento, por contener timerosal como excipiente, puede causar daño renal.

PRECAUCIONES

Dado que su uso es bajo control médico, son innecesarias.

INCOMPATIBILIDADES

No se han descrito.

EFFECTOS SECUNDARIOS

No se han descrito.

INTERACCIONES

No se han descrito.

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO

Al administrarse por vía oftálmica, no hay síntomas de intoxicación.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica.

Teléfono (91) 562 04 20.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO




Para abrir el envase, se situará éste en posición vertical y se efectuará un giro por el punto A. Efectuada la apertura del envase, por presión, se instilará el preparado en el saco conjuntival.

Efectuada la instilación, debe colocarse el capuchón que se ha separado en la apertura del envase, para evitar posibles contaminaciones.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Proteger de la luz y mantener a una temperatura no superior a 25° C. No congelar.

Desechar al mes de abierto el envase.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

PRESENTACIÓN

Envase de 10 ml.

CON RECETA MÉDICA

PRESCAINA 0,2% DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS

LABORATORIOS LLORENS, S.L.
Ciudad de Balaguer, 7-11 - 08022 Barcelona

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS)
<http://www.aemps.es/>